

## LES ROSES.

- R. *Villosa* (*Sylvestris*). DESV. Journ. Bot. sept. 1813, p. 117. Commun dans les bois, les buissons, les lieux pierreux, en France, en Angleterre et en Allemagne. Vulg. le *Rosier velu*, le *Rosier hispide*. Les pétales sont à peine colorés sur les individus sauvages; mais ils deviennent roses sur les pieds cultivés.
- β. R. *Villosa* (*Pomifera*). DESV. l. c. Var. γ.
- R. (*Sylvestris Pomifera*). DALECH. Hist. p. 127. Icon. LOB. Icon. 2, p. 211.
- R. (*Pomifera*). GM. Fl. Bad. 2, p. 410. Engl. Bot. Tab. 583. RED. Ros. 1, p. et fig. 67. Vulg. le *Rosier pomifère*.
- Sous-variété à pétales crénelés. Pépinière de M. NOISSETTE.
- γ. R. *Villosa* (*Pomifera*) fl. *multip.* Deux à trois rangs de pétales. Vulg. le *Rosier velu à fleurs doubles*; la *Rose pomme*. Elle est figurée dans miss LAW. Tab. 29.
- δ. R. *Villosa terebenthina*. (N.) Folioles grandes, d'un vert glauque, glutineuses, profondément dentées, laissant aux doigts une forte odeur de térébenthine. Fleurs petites et roses. Vulg. le *Rosier velu à odeur de térébenthine*. Pépinière de M. NOISSETTE.

\*\* Tubes glabres et pédoncules hispides.

- II. R. *Mollissima*. WILLD. Prod. Fl. Ber. n° 1237.
- R. (*Villosa* β.) DC. l. c. MERAT, Nouv. Fl. de Paris, var. β. NOUV. DUHAM. vol. 7, p. 44, var. β. R. (*Villosa nuda*). DESV. l. c. var. β.
- R. (*Dubia*). WIEBL. Fl. Werth. p. 263, et Suppl. 350.
- R. (*Villosa rotundifolia*). Bot. Cult. Vulg. le *Rosier velu à feuilles molles*, le *Rosier velu à feuilles rondes*.

§. B.

Tubes ovoïdes.

\* Pédoncules hispides, ainsi que les tubes.

- III. R. *Tomentosa*. SMITH. Fl. Brit. 539. DC. l. c. 3701.
- R. (*Villosa*, var. β.) HUDS. Fl. Anglica, p. 219. POIRET, l. c. p. 285. Excl. Syn. NOUV. DUHAM. l. c. var. γ.
- R. (*Villosa minuta*). RAU, l. c. p. 156, var. γ. Fruits très-petits.
- R. (*Canina tomentosa*). DESV. l. c. p. 115, var. μ.
- β. R. *Tomentosa* fl. *multipl.* Vulg. *Rosier cotonneux à fleurs doubles*.

\*\* Tubes et pédoncules absolument glabres.

- IV. R. *Farinosa*. RAU, En. Ros. p. 147. BECHST. Forstb. p. 243, n° 159. und p. 1046. (ex RAU). M. le professeur RAU a bien voulu nous envoyer cette espèce avec les plus intéressantes et les moins connues de celles de son *Enumeratio Rosarum*. Ses tubes ovoïdes sont aplatis ainsi que les styles. L'arbrisseau ne s'élève pas à plus de trois pieds; ses branches sont pendantes, et ses aiguillons plus courts et plus rares que dans les espèces précédentes. Il est commun aux environs de Wurzburg, où on le nomme le *Rosier farineux*, parce que l'arbuste, vu de loin, paraît d'un blanc-mat dans toutes ses parties.
- V. R. *Caucasica*. MARSCH. Fl. Taur. Cauc. 1, p. 400. PALL. Fl. Ross. 2, p. 62. Dans cette espèce, les tiges paraissent dépourvues d'aiguillons, les pétioles seuls en sont munis. Folioles doublement dentées, tomenteuses sur les deux faces. Fleurs d'un blanc lavé de rose. Croit dans la Tartarie asiatique. Vulg. le *Rosier du Caucase*; le *Rosier velu de Tartarie*. Nous l'avons vu dans l'herbier de M. LEMANCEAU DESCHALERIS.